

# LA DOULEUR N'EST PAS UNE FATALITE

## Soins douloureux Le bon usage des médicaments au bon moment

**Le meilleur moment pour exécuter un soin se situe quand l'agent antalgique déploie son plein effet (approximativement entre le pic plasmatique et la 1/2 vie). Ce tableau a été élaboré en fonction des données pharmaceutiques disponibles.**

■ On peut faire le soin. Maximum d'efficacité.
 ■ On ne doit pas faire le soin.
 ■ On peut commencer à faire le soin. Début d'action, mais elle n'est pas à son maximum.

Molécules	Spécialités	Voie d'administration	Prise Méd.	15 mn	30 mn	45 mn	1 h	15 mn	30 mn	45 mn	2 h	15 mn	30 mn	45 mn	3 h	4 h
Paracétamol	Doliprane®, Efferalgan® gel. à 500 mg	per os	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Perfalgan® amp. à 1 g	IV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kétoprofène	Profénid® gel. à 100 mg	per os	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Profénid® amp. à 100 mg	IV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Nefopam	Acupan® amp. à 20 mg	IV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dextropropoxyphène	Di-Antalvic® 1 gel	per os	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Codéine	Efferalgan codéiné® 1 cp.	per os	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tramadol	Topalgic®, Contramal®, gel. à 50 mg LI	per os	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Topalgic®, Contramal®, Amp. à 100 mg	IV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Morphine	Morphine à 10 mg	SC	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Sevredol® (cp.) 10-20 mg, Actiskénan® (cap.) 5-10-20 mg	per os	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Document de base: CLUD Hôpital Tenon AP-HP adapté pour l'Hôpital Avicenne - Graphidre



**Hôpital Avicenne**  
125, rue de Stalingrad  
93009 Bobigny Cedex

